



Medicijngebruik bij verminderde nierfunctie Huisartsenpraktijk


STAPPENPLAN



Geschatte nierfunctie op basis van CKD-EPI



Toelichting op achterzijde



* 50 - 60: individueel beoordelen

CKD-EPI is de nieuwe standaard en wordt ook gebruikt door SALTRO

Schatting eGFR op basis van CKD-EPI (Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration), uitgedrukt in aantal ml / min / 1,73 m²

Is de schatting van de nierfunctie niet op basis van CKD-EPI, gebruik dan de MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) formule.

De waarden kun je uitrekenen via de volgende website : https://www.knmp.nl/rekenmodules/creatinine_html

Benodigde informatie:

Serumcreatinine (umol/L)

Geslacht m/v

Leeftijd (jaar)

Negroïde ras J/N

Stap 4

Informeert apothek

Gekoppelde praktijken via Medicom/Pharmacom: de waarden komen automatisch in het systeem vanuit SALTRO. De apothek krijgt echter niet automatisch een signaal dat er een waarde is veranderd. Wil je hiervan wel zeker zijn, neem dan contact op met de apothek. Praktijken die niet gekoppeld zijn: gebruik het standaardformulier en de fax.

Naam:
Telefoon:
Fax:
<hr/>	
Betreft: melden / opvragen NIERFUNCTIE waarde	
Beste Collega,	
Wij willen graag een nierfunctiewaarde doorgeven / opvragen van de volgende patiënt.	
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Geboortedatum:
BSN:
Huisarts:
Datum uitslag:
..... ml / min / 1,73 m ² (CKD-EPI)	
..... ml / min / 1,73 m ² (MDRD)	

Voorbeeld van het standaardformulier